


Komplikationer under graviditet hos kvinnor opererade med bariatrik kirurgi


Lars Granström
Danderyds sjukhus



Symptom vid tarmshunt


- Diarré
- Leverpåverkan
- Ledbesvär
- Hudutslag
- Njursten
- Megacolon

Horisontell gastroplastik



Symtom horisontella gastroplastiker


- Initialt kräkningar
- Dålig viktnedgång
- Operationen märks ej efter ett antal år



Symptom vid bandoperationer

- Kräkningar
- Halsbränna
- Aspirationer


- Kräkningar accentueras vid graviditet
- Risk för intrauterin tillväxthämning



Symptom vid sleeve


- Kräkningar
- Reflux
- Accentuerad reflux vid graviditet


Duodenal switch



Syptom vid duodenal switch

- Sleeve biefekter
- Tarmshuntsbiverkan





Symptom vid interna bråck

- Buksmärta, ofta mot vä hypochondrium
- Accentuerade symptom vid födointag
- Buksmärtorna kommer och går
- "Allt är inte interna bråck" som gör ont
- Uteslut stomala ulcus, gallsten, IBS

Interna bråck under graviditet

- Svårvärderade symptom
- Graviditets komplikation?
- DT, strålrisk?
- Tidigt i graviditet -> liten uterus -> lap op
- Sent i graviditet -> konservativ attityd ->
- Låt barnet mogna
- TPN kan behövas
- Vid sectio åtgärda interna bråcket samtidigt

Gallsten under graviditet

- Tidig graviditet -> lätt med lap op
- Sen graviditet -> konservativ attityd. Operation efter partus

Tunntarmsinvagination efter GBP under graviditet

- Buksmärta intermittent vanligt
- Accentueras efter matintag
- Diagnos vid DT
- Tidigt under graviditet -> lap op
- Sent under graviditet -> konservativ attityd som vid handläggning av interna bråck

Sammafattning, obesitasoperation - graviditet

- Obesitasoperation är ett observandum
- Interna bråck är ett allvarligt tillstånd med mortalitet
- Tätt samarbete KK – Kir
- Varje patient är unik
- Profylax viktigt -> slut slitsarna vid GBP operationen!